

Modulprüfung zur Höheren Mathematik 3

für kyb, mecha, phys

Nachname, Vorname

Matrikelnummer

- ▶ Es gibt 10 Aufgaben mit insgesamt 60 Punkten. Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten.
- ▶ Es sind keine Hilfsmittel außer 2 DIN A4 Seiten einseitig (oder 1 DIN A4 Seite doppelseitig) handbeschriebener Formelsammlung zugelassen.
- ▶ In allen Aufgaben zählen Rechenweg und Begründungen. Benutzen Sie hierfür Ihr eigenes Papier, versehen Sie jedes Blatt mit Namen und Matrikelnummer und **beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt.**
- ▶ Aussagen aus Vorlesung und Übungen dürfen dabei verwendet werden, sofern sie nicht Gegenstand der Aufgabe selbst sind.
- ▶ Abgaben mit Bleistift, sowie Abgaben in roter oder grüner Farbe werden nicht gewertet.
- ▶ Legen Sie alle Blätter, die Sie abgeben möchten, am Ende des Bearbeitungszeitraumes in das Umschlagblatt.
- ▶ Den Inhalt der folgenden Tabellen können Sie ohne weitere Herleitung verwenden. Zur Hilfe bieten wir Ihnen folgende Übersicht.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

$f(x)$	x^a	e^x	$\sin(x)$	$\tan(x)$	$\sinh(x)$	$\operatorname{arsinh}(x)$
$f'(x)$	$a x^{a-1}$	e^x	$\cos(x)$	$1 + \tan(x)^2$	$\cosh(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$f(x)$	b^x	$\ln x $	$\cos(x)$	$\arctan(x)$	$\cosh(x)$	$\operatorname{arcosh}(x)$
$f'(x)$	$\ln(b) b^x$	$\frac{1}{x}$	$-\sin(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\sinh(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

$f(t)$	e^{kt}	$t^n e^{kt}$	$\cos kt$	$\sin kt$
$\mathcal{L}[f](\lambda)$	$\frac{1}{\lambda-k}$	$\frac{n!}{(\lambda-k)^{n+1}}$	$\frac{\lambda}{\lambda^2+k^2}$	$\frac{k}{\lambda^2+k^2}$

- ▶ Füllen Sie zunächst die oben stehenden Kästchen aus. Viel Erfolg bei der Prüfung!

A 1. [3+1+3 Punkte] Wir betrachten die Differentialgleichung

$$y' = Ay \quad \text{zur Matrix} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte und Eigenvektoren von A .
- (b) Bestimmen Sie die allgemeine **komplexe** Lösung $y_{\mathbb{C}}$ von $y' = Ay$.
- (c) Verwenden Sie (b), um die zugehörige allgemeine **reelle** Lösung $y_{\mathbb{R}}$ zu bestimmen.

Lösung: (a) Das charakteristische Polynom lautet

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)^2 + 4,$$

woraus man direkt die beiden Eigenwerte

$$\lambda_{1/2} = 4 \pm 2i$$

ablesen (oder berechnen) kann. Man bestimmt nun zwei zugehörige Eigenvektoren v_1, v_2 mittels der linearen Gleichungssysteme

$$Av - (4 \pm 2i)Iv = \begin{pmatrix} \mp 2i & -2 \\ 2 & \mp 2i \end{pmatrix} v = 0$$

und erhält dabei z.B.

$$v_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Die allgemeine komplexe Lösung $y_{\mathbb{C}}$ ist dann sofort gegeben durch

$$y_{\mathbb{C}}(x) = C_1 e^{(4+2i)x} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{(4-2i)x} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}.$$

(c) Mit der Euler-Identität folgt daraus dann

$$\begin{aligned} y_{\mathbb{C}}(x) &= C_1 e^{4x} (\cos 2x + i \sin 2x) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4x} (\cos 2x - i \sin 2x) \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= C_1 e^{4x} \begin{pmatrix} i \cos 2x - \sin 2x \\ \cos 2x + i \sin 2x \end{pmatrix} + C_2 e^{4x} \begin{pmatrix} -i \cos 2x - \sin 2x \\ \cos 2x - i \sin 2x \end{pmatrix} \\ &= C_1 e^{4x} \left(\begin{pmatrix} -\sin 2x \\ \cos 2x \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \cos 2x \\ \sin 2x \end{pmatrix} \right) + C_2 e^{4x} \left(\begin{pmatrix} -\sin 2x \\ \cos 2x \end{pmatrix} - i \begin{pmatrix} \cos 2x \\ \sin 2x \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

und daraus die allgemeine reelle Lösung

$$y_{\mathbb{R}}(x) = c_1 e^{4x} \begin{pmatrix} -\sin 2x \\ \cos 2x \end{pmatrix} + c_2 e^{4x} \begin{pmatrix} \cos 2x \\ \sin 2x \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

A 2. [1+2+1 Punkte] Wir betrachten die durch

$$u(x, y) = e^x \cos y + e^y \cos x$$

gegebene Funktion $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Ist u harmonisch?
 (b) Wir identifizieren nun wie in der Vorlesung \mathbb{C} mit \mathbb{R}^2 und schreiben $z = x + iy$. Bestimmen Sie eine Funktion $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, so dass die Abbildung $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$$

holomorph auf ganz \mathbb{C} ist.

- (c) Schreiben Sie f als Funktion von z .

Lösung: (a) Ja, denn es ist

$$\Delta u(x, y) = \partial_x^2 u(x, y) + \partial_y^2 u(x, y) = e^x \cos y - e^y \cos x - e^x \cos y + e^y \cos x = 0.$$

(b) Bezüglich u muss v die Cauchy–Riemann-Differentialgleichungen erfüllen, d.h.

$$\begin{aligned} \partial_y v(x, y) &= \partial_x u(x, y) = e^x \cos y - e^y \sin x, & \text{sowie} \\ \partial_x v(x, y) &= -\partial_y u(x, y) = e^x \sin y - e^y \cos x. \end{aligned}$$

Integration nach y bzw. x liefert dann die Gleichung

$$\int \partial_y v(x, y) dy = e^x \sin y - e^y \sin x + C_1(x) \stackrel{!}{=} e^x \sin y - e^y \sin x + C_2(y) = \int \partial_x v(x, y) dx,$$

also $C_1(x) = c = C_2(y)$ mit beliebiger Konstanten c und somit z.B.

$$v(x, y) = e^x \sin y - e^y \sin x.$$

(c) Mit Teilaufgabe (b) gilt

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x \cos y + e^y \cos x + ie^x \sin y - ie^y \sin x \\ &= e^x (\cos y + i \sin y) + e^y (\cos x - i \sin x) \\ &= e^x e^{iy} + e^y e^{-ix} \\ &= e^z + e^{-iz}. \end{aligned}$$

A 3. [7 Punkte] Berechnen Sie das Integral

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

mit Hilfe des Residuensatzes. Wählen Sie dazu einen geeigneten geschlossenen Integrationsweg γ und begründen Sie insbesondere, weshalb $I = \oint_{\gamma} f(z) dz$ gilt.

Lösung: Wir wählen als geschlossenen Integrationsweg γ einen Halbkreis γ_R mit Radius $R > 0$ in der Halbebene $\text{Im } z \geq 0$ verknüpft mit dem Streckenstück $[-R, R]$ auf der reellen Achse, d.h.

$$\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$$

und betrachten später dann den Grenzwert $R \rightarrow \infty$.


Von den vier Singularitäten

$$z_j = \exp\left(\frac{i\pi}{4} + \frac{ij\pi}{2}\right) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} i, \quad j = 0, 1, 2, 3$$

der Funktion

$$f(z) := \frac{z^2}{1+z^4}$$

liegen nur z_0 und z_1 in der oberen Halbebene und sind dabei Pole der Ordnung $N = 1$ mit zugehörigen Residuen



$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{z^2}{(z - z_0)(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)} = \frac{z_0^2}{(z_0 - z_1)(z_0 - z_2)(z_0 - z_3)} \\ &= \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}(1+i)^2}{\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}i)\sqrt{2}i} = \frac{i}{2\sqrt{2}i - 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{1}{1+i} = \frac{1}{4\sqrt{2}}(1-i) \end{aligned}$$

und analog

$$\text{Res}(f, z_1) = \frac{z_1^2}{(z_1 - z_0)(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)} = \frac{1}{4\sqrt{2}}(-1-i).$$

Der Residuensatz liefert nun (beachte, dass Umlaufzahl = 1)

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, z_0) + \text{Res}(f, z_1)) = 2\pi i \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \cdot (-2i)\right) = -\frac{\pi i^2}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Wir zeigen nun, dass das Integral

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz$$

für $R \rightarrow \infty$ verschwindet: Wir wählen eine Parametrisierung von γ_R

$$\gamma_R : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_R(t) = R e^{it}$$

und nutzen diese (mit $R > 1$) für die Abschätzung

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| &\leq L(\gamma_R) \cdot \max_{z \in \text{Bild}(\gamma_R)} |f(z)| \\ &\leq \pi R \cdot \max_{t \in [0, \pi]} \left| \frac{R^2 e^{2it}}{1 + R^4 e^{4it}} \right| \leq \frac{\pi R^3}{R^4 - 1} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

Es folgt

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{[-R, R]} f(x) dx \rightarrow 0 + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

A 4. [4+2 Punkte] Sei $0 < a < \pi$. Wir betrachten die Funktion $f : (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & \text{für } |x| < a, \\ 0 & \text{für } -\pi < x \leq -a \text{ oder } a \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

- (a) Berechnen Sie die **reelle** Fourierreihe der 2π -periodischen Fortsetzung von f .
 (b) Nutzen Sie die Fourierreihe aus (a), um den Wert der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n}$$

zu bestimmen.

Lösung: (a) Wir bezeichnen die Fortsetzung von f wieder mit f . Da f eine gerade und reellwertige Funktion ist, gilt $b_n = 0$ und deshalb kann ihre Fourierreihe durch

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

dargestellt werden. Dabei ist

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^a \frac{1}{2a} d\theta + \int_{2\pi-a}^{2\pi} \frac{1}{2a} d\theta \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{a}{2a} - 0 + \frac{2\pi}{2a} - \frac{2\pi-a}{2a} \right) = \frac{1}{2\pi} \end{aligned}$$

sowie

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^a \frac{1}{2a} \cos(n\theta) d\theta + \int_{2\pi-a}^{2\pi} \frac{1}{2a} \cos(n\theta) d\theta \right)$$

Dies kann direkt berechnet werden. Da der Integrand gerade und 2π -periodisch ist, gilt aber sofort

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{1}{2a} \cos(n\theta) d\theta = \frac{1}{\pi a} \left[\frac{1}{n} \sin(n\theta) \right]_0^a = \frac{\sin na}{\pi na}$$

und damit

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{\pi na} \cos nx$$

(b) Da f Lipschitz-stetig in einer Umgebung der 0 ist, folgt (in einer etwas kleineren Umgebung) die gleichmäßige Konvergenz der Fourierreihe und somit insbesondere

$$\frac{1}{2a} = f(0) = \frac{1}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{\pi na} \cos 0 = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n}$$

und damit

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n} = \pi a \left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{2\pi} \right) = \frac{\pi - a}{2}.$$

A 5. [5+1+3 Punkte] Betrachten Sie zu $a, b > 0$ die Menge

$$M_{a,b} := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 4 \right\}.$$

- (a) Nutzen Sie das Vektorfeld $w(x, y) = \frac{1}{2}(x, y)^T$, um mit Hilfe des Satzes von Ostrogradski-Gauss den Flächeninhalt von $M_{a,b}$ zu berechnen.
- (b) Sei weiter $Z := M_{1,1} \times [-1, 1] \subset \mathbb{R}^3$. Skizzieren Sie Z .
- (c) Sei ferner das Vektorfeld $v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$v(x, y, z) = (2x, y^2, y^2)^T.$$

Berechnen Sie $\int_{\partial Z} v \cdot d\vec{A}$.

Lösung: (a) Der Satz von Ostrogradski-Gauss ("Gauss in \mathbb{R}^2 ") angewandt auf unsere Menge $M_{a,b}$ lautet

$$\int_{M_{a,b}} \operatorname{div} w \, dV = - \int_{\partial M_{a,b}} w \cdot d\vec{s}^\perp,$$

wobei hier

$$\operatorname{div} w = \partial_x w_1 + \partial_y w_2 = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

gilt; das linke Integral ist also genau der Flächeninhalt von $M_{a,b}$. Zur Berechnung der rechten Seite parametrisieren also zunächst die Ellipse $\partial M_{a,b}$ durch $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = (2a \cos t, 2b \sin t)^T.$$

Damit ergibt sich $w \cdot d\vec{s}^\perp$ wegen $d\vec{s}^\perp = (-dy, dx)^T$ zu

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2a \cos t \\ 2b \sin t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2b \cos t \\ -2a \sin t \end{pmatrix} = -2ab(\cos^2 t + \sin^2 t) = -2ab$$

und damit

$$|M_{a,b}| = \int_{M_{a,b}} 1 \, dA = \int_{M_{a,b}} \operatorname{div} w \, dA = - \int_{\partial M_{a,b}} w \cdot d\vec{s}^\perp = \int_0^{2\pi} 2ab \, dt = 4\pi ab.$$

(b) $M_{a,b}$ ist eine Ellipse mit Längen der Halbachsen $2a$ und $2b$, $M_{1,1}$ ist daher ein Kreis mit Radius 2 und Z folglich ein Zylinder mit Radius 2 und Höhe $||[-1, 1]|| = 2$. (In der Skizze muss nur erkennbar sein, dass es sich um einen Zylinder handelt.)

(c) Für den Integralsatz von Gauss

$$\int_Z \operatorname{div} v \, dV = \int_{\partial Z} v \cdot d\vec{A}$$

berechnen wir zunächst

$$\operatorname{div} v = 2 + 2y.$$

Da in Zylinderkoordinaten $y = r \sin \varphi$ gilt, folgt mit dem Transformationssatz dann

$$\int_{\partial Z} v \cdot d\vec{A} = \int_Z 2 + 2y \, dV = 2|Z| + \int_{-1}^1 \int_0^2 \int_0^{2\pi} r \int_0^{2\pi} (2r \sin \varphi) \, d\varphi \, dr \, dz.$$

Da das Integral über die Winkel verschwindet und das Volumen des Zylinders $|Z| = A \cdot h = 4\pi \cdot 2 = 8\pi$ ist, folgt

$$\int_{\partial Z} v \cdot d\vec{A} = 2|Z| = 16\pi.$$

A 6. [3+3+2 Punkte] Gegeben sei die Funktion

$$f(z) = \frac{z + 2}{1 + (z + 2)^2}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Polstellen von f und die zugehörigen Residuen.
- (b) Gegeben seien die Wege

$$\begin{aligned} \gamma_1 : [0, 1) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_1(t) &= e^{4\pi i t}, \\ \gamma_2 : [0, 1) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_2(t) &= 4e^{4\pi i t}. \end{aligned}$$

Skizzieren Sie beide Wege und die Polstellen in ein gemeinsames Schaubild. Berechnen Sie die beiden Integrale


$$(i) \int_{\gamma_1} f(z) dz, \quad (ii) \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

- (c) Entwickeln Sie die Funktion in $z_0 = -2$ in eine Potenzreihe und geben Sie den Konvergenzradius an.

Lösung: (a) Die Polstellen von f sind gegeben durch $z_{1/2} = -2 \pm i$, die zugehörigen Residuen sind damit

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, -2 + i) &= \left. \frac{z + 2}{z + 2 + i} \right|_{z=-2+i} = \frac{1}{2}, \\ \text{Res}(f, -2 - i) &= \left. \frac{z + 2}{z + 2 - i} \right|_{z=-2-i} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b)



Das Integral über γ_1 ist null, da f in $B_2(0)$ holomorph und der Weg geschlossen ist. Für das Integral über γ_2 verwenden wir den Residuensatz und erhalten wegen der Umlaufzahl 2 damit

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = 2\pi i (2 \text{Res}(f, -2 + i) + 2 \text{Res}(f, -2 - i)) = 4\pi i.$$

(c) Für die Potenzreihe erkennen wir, dass die Funktion auf $(z + 2)$ -mal eine geometrische Reihe zurückgeführt werden kann, d.h.

$$\begin{aligned} \frac{z + 2}{1 - (-(z + 2)^2)} &= (z + 2) \sum_{k=0}^{\infty} (-(z + 2)^2)^k \\ &= (z + 2) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z + 2)^{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z + 2)^{2k+1}. \end{aligned}$$

Mit dem Konvergenzradius der geometrischen Reihe sieht man, dass der Konvergenzradius 1 ist.

A 7. [4 Punkte] Bestimmen Sie mit Hilfe der Laplacetransformation die Lösung f der Differential-Integralgleichung

$$f'(x) = 4 \int_0^x e^{-3(x-y)} f(y) dy, \quad f(0) = 1.$$

Lösung: Wir wenden die Laplacetransformation \mathcal{L} auf die Differential-Integralgleichung an und verwenden die Notation $\mathcal{L}[f](\lambda) =: F(\lambda)$. So erhalten wir durch Anwendung des Differentiations- sowie des Faltungssatzes

$$\lambda F(\lambda) - f(0) = \frac{4F(\lambda)}{\lambda + 3},$$

wobei wir verwendet haben, dass

$$\mathcal{L}[e^{-3x}](\lambda) = \frac{1}{\lambda + 3}$$

gilt. Umformen liefert

$$\left(\lambda - \frac{4}{\lambda + 3}\right) F(\lambda) = f(0) = 1$$

und somit via Partialbruchzerlegung

$$F(\lambda) = \frac{\lambda + 3}{\lambda^2 + 3\lambda - 4} = \frac{4}{5(\lambda - 1)} + \frac{1}{5(\lambda + 4)}.$$

Damit ergibt sich durch Rücktransformation als Lösung

$$f(x) = \frac{4}{5}e^x + \frac{1}{5}e^{-4x}.$$

A 8. [1+4 Punkte] Gegeben seien die Menge

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq ye^{-x} \leq 9 \wedge 1 \leq ye^x \leq 9\}$$

und die Transformation $\varphi : M \rightarrow [1, 9] \times [1, 9]$ mit

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} ye^{-x} \\ ye^x \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Funktionaldeterminante $\det(\varphi'(x, y))$.
- (b) Berechnen Sie den Flächeninhalt von M mit Hilfe der Transformationsformel für Volumenintegrale.

Lösung: (a) Die Funktionaldeterminante ist die Determinante der Jacobimatrix von $\varphi(x, y)$. Es gilt

$$\det \varphi'(x, y) = \det \begin{pmatrix} -ye^{-x} & e^{-x} \\ ye^x & e^x \end{pmatrix} = -2y.$$

(b) Um den Flächeninhalt von M zu berechnen, verwenden wir den Transformationssatz und erhalten

$$\text{vol } M = \int_M 1 \, dV = \int_{\varphi^{-1}(M)} |\det(\varphi^{-1})'(u, v)| \, dV.$$

Wir führen die Variablen $u = ye^{-x}$ und $v = ye^x$ ein. Dann gilt

$$y^2 = u \cdot v,$$

insbesondere ist φ injektiv und der Transformationssatz anwendbar. Aus (a) folgt dann

$$|\det(\varphi^{-1})'(u, v)| = \left| \frac{1}{\det \varphi'(x(u, v), y(u, v))} \right| = \left| \frac{1}{-2y(u, v)} \right| = \frac{1}{2\sqrt{uv}}.$$

Damit ergibt sich für den Flächeninhalt von M

$$\text{vol } M = \int_1^9 \int_1^9 \frac{1}{2\sqrt{uv}} \, du \, dv = 2 [\sqrt{u}]_1^9 [\sqrt{v}]_1^9 = 8.$$

A 9. [3+3+1 Punkte] Gegeben sei die lineare Differentialgleichung

$$y' - \frac{2y}{1-x^2} - x - 1 = 0, \quad -1 < x < 1.$$

- (a) Bestimmen Sie alle Lösungen des zugehörigen homogenen Problems.
- (b) Finden Sie eine spezielle Lösung des inhomogenen Problems.
- (c) Lösen Sie die Differentialgleichung zum Anfangswert $y(0) = \frac{1}{2}$.

Lösung: (a) Wir betrachten das homogene Problem

$$y' - \frac{2y}{1-x^2} = 0.$$

Wir betrachten den Fall, dass $y(x) \neq 0$ für alle $-1 < x < 1$ ist. Mit Hilfe der Trennung der Variablen erhalten wir für $y \neq 0$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{y} dy &= \int \frac{2}{1-x^2} dx \\ \Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy &= \int \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} dx \\ \Leftrightarrow \ln |y| &= \ln \frac{1+x}{1-x} + c, \quad c \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow y &= C \frac{1+x}{1-x}, \quad C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Für den Fall, dass ein x existiert mit $y(x) = 0$, ist $y \equiv 0$ eine Lösung. Zusammen erhalten wir die allgemeine Lösung

$$y_{\text{hom}}(x) = C \frac{1+x}{1-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

(b) Um eine spezielle Lösung zu finden, verwenden wir die Variation der Konstanten. Wir setzen dazu

$$y(x) = C(x) \frac{1+x}{1-x}$$

in die Differentialgleichung ein und erhalten

$$C'(x) \frac{1+x}{1-x} + \underbrace{C(x) \frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2} - 2C(x) \frac{1+x}{1-x} \frac{1}{(1-x)(1+x)}}_{=0} = 1+x$$

und damit $C'(x) = 1-x$, also zum Beispiel $C(x) = x - \frac{1}{2}x^2$. Demnach ist eine spezielle Lösung des inhomogenen Problems gegeben durch

$$y_{\text{spez}}(x) = \left(x - \frac{1}{2}x^2\right) \frac{1+x}{1-x}.$$

(c) Die allgemeine Lösung des inhomogenen Problems lautet

$$y(x) = y_{\text{hom}}(x) + y_{\text{spez}}(x) = \left(C + x - \frac{1}{2}x^2\right) \frac{1+x}{1-x}.$$

Einsetzen des Anfangswertes liefert $C = \frac{1}{2}$, also ist die Lösung des AWP gegeben durch

$$y(x) = \left(\frac{1}{2} + x - \frac{1}{2}x^2\right) \frac{1+x}{1-x}.$$

A 10. [3 Punkte] Es sei $U \subset \mathbb{C}$ eine offene Menge, $G \subset U$ ein beschränktes Gebiet mit $\partial G \subset U$ und $p \in G$ ein Punkt im Gebiet. Weiterhin sei $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph mit der Eigenschaft

$$|f(p)| < \min\{|f(z)| : z \in \partial G\}.$$

Zeigen Sie, dass f eine Nullstelle in G besitzt.

Lösung: Angenommen, f habe keine Nullstelle in G . Dann ist $g = 1/f$ holomorph auf G . Weiterhin gilt

$$|g(p)| > \max\{|g(z)| : z \in \partial G\}.$$

Dies ist ein Widerspruch zum Maximumsprinzip. Also muss f eine Nullstelle in G besitzen.